

Le TPE

Qu'est-ce que c'est ?

Le TPE (Traitement Post Exposition) est **un traitement anti-rétroviral temporaire de 28 jours** à prendre dans les **48h** qui suivent un rapport sexuel à risque.

Son but est **de diminuer le risque d'infection par le VIH** immédiatement après un risque d'exposition : rapport non protégé, rupture de préservatif, éjaculation dans la bouche...

Pour qui ?

Il concerne les personnes séronégatives ou qui ne connaissent pas leur statut sérologique.

Où ?

Rendez-vous le plus vite possible à l'hôpital (au mieux dans les 4 h et au plus tard dans les 48 h après la prise de risque), de préférence avec votre partenaire sexuel :

- **au CeGIDD** du lundi au vendredi de 9h à 16h30 et le samedi matin de 9h à 13h.
- **aux urgences** en dehors des ouvertures du CeGIDD

Vous serez pris(e) en charge par un médecin qui évaluera avec vous le risque pris et l'intérêt ou pas de vous prescrire un traitement post-exposition.

Le jour même (J0) une prise de sang sera réalisée afin de connaître votre statut sérologique du VIH, des hépatites B et C et de la syphilis.

Puis un suivi médical régulier est nécessaire durant les mois suivants :

- M 1 :
- M 2 :
- M 4 :

Si je dépasse les 48 heures ?

Si la prise de risque date de plus de 48 h, le TPE devient inefficace, seul le prélèvement sanguin sera effectué.

Si le résultat du test est négatif, ce n'est que 6 semaines après la prise de risque qu'un **autre test sanguin** permettra de savoir avec certitude que vous n'êtes pas atteint par le VIH.

Et le(s) partenaires(s) ?

Après une prise de risque, **il est important d'utiliser systématiquement le préservatif**, avec tous vos partenaires, jusqu'au prochain résultat des tests de dépistage.

Qu'est-ce qu'une IST?

Les Infections **Sexuellement Transmissibles** se transmettent lors des pratiques sexuelles : pénétration vaginale et anale, fellation, cunnilingus, anulingus, caresse/masturbation sexe contre sexe. Un simple contact entre muqueuses peut aussi être à l'origine d'une infection par une IST.

Il existe de nombreuses IST mais les plus connues sont le VIH, les hépatites B et C, la syphilis, la chlamydia, le gonocoque, le papillomavirus et l'herpès génital.

La plupart du temps, les symptômes des IST sont très discrets voire inexistants.

Cependant, en présence de symptômes évoquant une IST, un examen médical est nécessaire car **chaque IST a un traitement spécifique** qui doit être accompagné de mesures individuelles pour faciliter la guérison et limiter la transmission du germe responsable.

Quand faire un test de dépistage ?

- Après une prise de risque pour savoir si on a été infecté (rapport sans préservatif ou rupture de préservatif)
- Quand on a une relation stable et régulière avec le/la même partenaire et qu'on ne veut plus mettre de préservatif.
- Lorsqu'une grossesse est envisagée.
- Pour savoir, tout simplement, et peut-être se rassurer.

Liste des intervenants au sein du CeGIDD

Mme Isabelle CHAMBON

Psychologue Clinicienne
Lundi – Mardi - Jeudi
Sur RDV au 0494145791

Mme Sandra GUIADEFUR

Conseillère Conjugale et sexologue
Vendredi 14h – 17h
Sur RDV au 0494145056

Assistante Sociale

Sur RDV au 0494145875

Gynécologue

Sur RDV au 0494145752

CeGIDD

Centre Gratuit d'Information,
de Dépistage
et de Diagnostic des infections par le VIH,
les hépatites virales et les infections
sexuellement transmissibles

Tel : 04 94 14 50 56

www.cegidd-83.fr



Horaires d'ouverture
avec ou sans rendez-vous :

Hôpital STE MUSSE TOULON

Avenue Henri Ste Claire Deville
Lundi 13h00 - 16h30
Mardi 9h00 - 13h00
Vendredi 14h30 – 16h30
Samedi 9h00 – 13h00

Hôpital de HYERES

8 rue Maréchal Juin 83400 Hyères
Jeudi 14h30 – 17h30

Hôpital Georges SAND

Avenue Jules Renard 83500 LA SEYNE/MER
Vendredi 9h00-13h00

Hôpital de Brignoles

Rue Joseph Monnier 83170 Brignoles
Mercredi 9h00 – 13h00



A.E.V

ACCIDENT D'EXPOSITION AU RISQUE VIRAL

