

# GONOCOQUE

## Qu'est-ce que c'est ?

Le gonocoque est une bactérie. Elle est responsable de la gonococcie, maladie aussi appelée "blennorragie" ou plus familièrement "chaude pisse".

Elle se propage lors d'un contact sexuel buccal, vaginal ou anal mais aussi lors des caresses sexuelles.

## Quels sont les signes ?

Le plus souvent, il n'y a pas de signe de l'infection et la personne ne sait pas qu'elle est atteinte.

**Seul le dépistage permettra de faire le diagnostic précoce.**

Le délai entre la contamination et le début des signes est de 3 à 5 jours :

**La femme présente une inflammation de l'urètre et du col de l'utérus avec symptômes discrets :**

- une pollakiurie (fréquence excessive des mictions)
- des brûlures à l'évacuation des urines
- des pertes contenant du pus

**L'homme présente une urétrite aigue : brûlures urinaires et présence de pus à la sortie de l'urètre.**

**Il existe chez certains patients une balanite (inflammation du gland)**

**ATTENTION: après une infection à gonocoque guérie vous n'êtes pas immunisé ni protégé : vous pouvez en attraper une autre !**

## Comment faire le diagnostic ?

La seule façon d'avoir la certitude du diagnostic est de faire une analyse d'urines spécifique et/ou de gorge, vaginale ou anale.

## Quels sont les risques d'une infection par le gonocoque ?

Si l'infection à gonocoque n'est pas soignée, elle peut causer, chez :

**La femme : douleurs chroniques du ventre, salpingite (infection grave de l'utérus et des trompes pouvant causer une stérilité ou une grossesse extra-utérine).**

**L'homme : infection chronique de la prostate, infection chronique du canal spermatique provoquant parfois une stérilité.**

**L'infection à gonocoque augmente le risque de transmission du VIH et des autres IST.**

## L'infection à gonocoque est-elle curable ?

**Oui** : toutes les personnes chez qui on a diagnostiquée cette infection bénéficient d'un traitement antibiotique dès que possible.

## Le traitement est-il efficace ?

L'efficacité est très élevée mais il est important de faire un **nouveau prélèvement de contrôle 1 mois après le traitement**, afin d'être certain que l'infection est guérie.

## Combien de temps est-on contagieux ?

Une personne infectée est contagieuse tant qu'elle n'a pas reçu le traitement.

**Toute personne qui bénéficie du traitement est invitée à utiliser un préservatif pour tout contact sexuel (vaginal, anal ou buccal) pendant au moins 8 jours.**

## Et le(s) partenaire(s) ?

Afin d'éviter la transmission de la maladie et ses complications, il est important que le ou les partenaire(s) sexuel(s) de toute personne infectée puisse(nt) bénéficier **d'un test de dépistage** et suivre **un traitement** si besoin.

C'est pourquoi, **une personne chez qui on a diagnostiquée une infection à gonocoque est encouragée à contacter le ou les partenaire(s) avec qui elle a eu des rapports sexuels pour le(les) inciter au dépistage.**

## Qu'est-ce qu'une IST?

Les Infections Sexuellement Transmissibles se transmettent lors des pratiques sexuelles : pénétration vaginale et anale, fellation, cunnilingus, anulingus, caresse/masturbation sexe contre sexe. Un simple contact entre muqueuses peut aussi être à l'origine d'une infection par une IST.

Il existe de nombreuses IST mais les plus connues sont le VIH, les hépatites B et C, la syphilis, la chlamydia, le gonocoque, le papillomavirus et l'herpès génital.

La plupart du temps, les symptômes des IST sont très discrets voire inexistants.

Cependant, en présence de symptômes évoquant une IST, un examen médical est nécessaire car **chaque IST a un traitement spécifique** qui doit être accompagné de mesures individuelles pour faciliter la guérison et limiter la transmission du germe responsable.

## Quand faire un test de dépistage ?

- Après une prise de risque pour savoir si on a été infecté (rapport sans préservatif ou rupture de préservatif)
- Quand on a une relation stable et régulière avec le/la même partenaire et qu'on ne veut plus mettre de préservatif.
- Lorsqu'une grossesse est envisagée.
- Pour savoir, tout simplement, et peut-être se rassurer.

# CeGIDD

Centre Gratuit d'Information,  
de Dépistage  
et de Diagnostic des infections par le VIH,  
les hépatites virales et les infections  
sexuellement transmissibles

Tel : 04 94 14 50 56

[www.cegidd-83.fr](http://www.cegidd-83.fr)



Horaires d'ouverture  
avec ou sans rendez-vous :

**Hôpital STE MUSSE TOULON**  
Avenue Henri Ste Claire Deville  
Lundi 13h00 - 16h30  
Mardi 9h00 - 13h00  
Vendredi 14h30 – 16h30  
Samedi 9h00 – 13h00

-----  
**Hôpital de HYERES**  
8 rue Maréchal Juin 83400 Hyères  
Jeudi 14h30 – 17h30

-----  
**Hôpital Georges SAND**  
Avenue Jules Renard 83500 LA SEYNE/MER  
Vendredi 9h00-13h00

-----  
**Hôpital de Brignoles**  
Rue Joseph Monnier 83170 Brignoles  
Mercredi 9h00 – 13h00



# Le GONOCOQUE

## une Infection Sexuellement Transmissible

