

SYPHILIS

Qu'est-ce que c'est ?

Maladie vénérienne très ancienne, la syphilis est due à une bactérie, le tréponème pâle. Elle se propage lors d'un contact sexuel buccal, vaginal ou anal mais aussi lors des caresses sexuelles. On retrouve aussi une transmission mère/enfant pendant l'accouchement.

Quel sont les signes ?

Le plus souvent, il n'y a pas de signe de l'infection et la personne ne sait pas qu'elle est atteinte.

Seul le dépistage permettra de faire le diagnostic précoce.

L'infection se développe en **trois stades** et les symptômes sont différents à chaque stade.

1er stade : entre 10 et 90 jours après l'infection. Apparition possible d'un chancre (petite plaie indolore) sur la peau ou les muqueuses (pénis, gland, testicules, clitoris, vagin, anus, tétons, rectum, lèvres, bouche, gorge).

Le chancre disparaîtra sans traitement après 3 à 6 semaines. Néanmoins, vous continuez d'être porteur de la syphilis. Il faut donc se protéger et protéger son/sa/ses partenaire(s).

2ème stade : parfois apparaissant de façon simultanée au chancre, mais peuvent apparaître entre 6 semaines à 6 mois :

- des éruptions cutanées (poitrine, dos, et de façon caractéristique : paumes des mains et plantes des pieds, zone génitale).
- possibles douleurs articulaires et musculaires.
- fièvre et/ou perte de cheveux en plaques.

Ces symptômes disparaîtront sans traitement mais l'infection est toujours présente (syphilis latente).

3ème stade : entre 10 et 30 ans après le contact infectant, la présence de lésions sévères des organes vitaux et du système nerveux (cœur, cerveau, yeux et os)

L'infection à tréponème augmente le risque de transmission du VIH et des autres IST.

Comment faire le diagnostic ?

La seule façon d'avoir la certitude du diagnostic est de faire une sérologie par prise de sang.

La syphilis est-elle curable ?

Oui : toutes les personnes chez qui on a diagnostiquée cette infection bénéficient d'un **traitement antibiotique** dès que possible.

Le traitement est-il efficace ?

L'efficacité est très élevée mais il est important de faire **un nouveau prélèvement de contrôle 6 mois après le traitement**, afin d'être certain que l'infection est guérie.

ATTENTION: après une syphilis guérie vous n'êtes pas immunisé ni protégé : vous pouvez en attraper une autre !

Combien de temps est-on contagieux ?

Une personne infectée est contagieuse tant qu'elle n'a pas reçu le traitement.

Toute personne qui bénéficie du traitement est invitée à utiliser un préservatif pour tout contact sexuel (vaginal, anal ou buccal) pendant au moins 8 jours.

Et le(s) partenaire(s) ?

Afin d'éviter la transmission de la maladie et ses complications, il est important que le ou les partenaire(s) sexuel(s) de toute personne infectée puisse(nt) bénéficier **d'un test de dépistage** et suivre **un traitement** si besoin.

C'est pourquoi, **une personne chez qui on a diagnostiquée une syphilis est encouragée à contacter le ou les partenaire(s) avec qui elle a eu des rapports sexuels pour le(les) inciter au dépistage.**

Qu'est-ce qu'une IST?

Les Infections Sexuellement Transmissibles se transmettent lors des pratiques sexuelles : pénétration vaginale et anale, fellation, cunnilingus, anulingus, caresse/masturbation sexe contre sexe. Un simple contact entre muqueuses peut aussi être à l'origine d'une infection par une IST.

Il existe de nombreuses IST mais les plus connues sont le VIH, les hépatites B et C, la syphilis, la chlamydia, le gonocoque, le papillomavirus et l'herpès génital.

La plupart du temps, les symptômes des IST sont très discrets voire inexistants.

Cependant, en présence de symptômes évoquant une IST, un examen médical est nécessaire car **chaque IST a un traitement spécifique** qui doit être accompagné de mesures individuelles pour faciliter la guérison et limiter la transmission du germe responsable.

Quand faire un test de dépistage ?

- Après une prise de risque pour savoir si on a été infecté (rapport sans préservatif ou rupture de préservatif)
- Quand on a une relation stable et régulière avec le/la même partenaire et qu'on ne veut plus mettre de préservatif.
- Lorsqu'une grossesse est envisagée.
- Pour savoir, tout simplement, et peut-être se rassurer.

CeGIDD

Centre Gratuit d'Information,
de Dépistage
et de Diagnostic des infections par le VIH,
les hépatites virales et les infections
sexuellement transmissibles

Tel : 04 94 14 50 56

www.cegidd-83.fr



Horaires d'ouverture
avec ou sans rendez-vous :

Hôpital STE MUSSE TOULON
Avenue Henri Ste Claire Deville
Lundi 13h00 - 16h30
Mardi 9h00 - 13h00
Vendredi 14h30 – 16h30
Samedi 9h00 – 13h00

Hôpital de HYERES
8 rue Maréchal Juin 83400 Hyères
Jeudi 14h30 – 17h30

Hôpital Georges SAND
Avenue Jules Renard 83500 LA SEYNE/MER
Vendredi 9h00-13h00

Hôpital de Brignoles
Rue Joseph Monnier 83170 Brignoles
Mercredi 9h00 – 13h00



La SYPHILIS

une Infection Sexuellement Transmissible

